

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni

<https://www.piwetwrzesnia.pl/iiw/dla-rolnikow-i-hodowcow/3550,Ptasia-grypa-fruwa.html>
26.04.2024, 06:41

Ptasia grypa fruwa

Analizując sytuację ptasiej grypy (HPAI) w Europie można stwierdzić, że grypa ptasia jest ciągle aktualna. W lecie tego roku, stwierdzono kilka ognisk choroby u drobiu domowego w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Bułgarii a najwięcej w Rosji.

W Polsce stwierdzono wirusa grypy jedynie u ptactwa wodnego dzikiego, u którego choroba występuje stacjonarnie i rzadko wykazuje objawy kliniczne, to często wirus przenoszony jest do środowiska, dlatego może pojawić się w hodowlach w każdej chwili.

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym oraz wzmożoną migracją ptaków, w gospodarstwach utrzymujących drób domowy (fermowy i przyzagrodowy) należy podjąć wszelkie działania mające na celu niedopuszczenie do przeniknięcia wirusa ptasiej grypy.

W sytuacji, kiedy rygorystycznie przestrzega się zasad bioasekuracji w stadach drobiu, to w środowisku ptaków dzikich, które są roznosicielem wirusa, te zasady niestety nie obowiązują.

Jak wykazywały dotychczasowe doświadczenia w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt najskuteczniejszą i najtańszą metodą ustrzeżenia gospodarstw przed wirusem jest prewencja poprzez stosowanie zasad bioasekuracji.

Dlatego w ramach prewencji, hodowcy już teraz powinni przystąpić do:

- zabezpieczenia słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);
- regularnego przeglądu wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);
- w miarę możliwości powstrzymania się tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz o zabezpieczenia istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa;
- powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);

- > jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęstszego usuwania opadłych owoców
- > gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni

lek. wet. Romuald Juściński

Metadane

Data publikacji : 24.08.2017

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:

Administrator BIP

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)